

3M-Test-Glycémie 20-800 R

50 TESTS

Retenez bien,
lisez le mode d'emploi.
Les prospectus,
et les instructions.

Indice de couleur	Indice N° 1	Indice N° 2
rouge	1	41-71
	2	74-126
bleu	1	23-33
	2	13,6-16,7

UNICO DIAGNOSTICUM

3M-Test-Glycémie 20-800

Les indices pour
comparaison
concentrations de
sucre

2 ml de
2 ml de



ou rouge,
après de:

1) aspirer le sang
2) comparer les
couleurs.



3) verser quelques
gouttes de
4) attendre que
les couleurs
soient stables.



Les prospectus

1) aspirer une goutte de
sang au pipet.

2) aspirer le sang
au pipet.

3) comparer avec
les couleurs.

4) attendre quelques
minutes et
comparer.



et les instructions



SINTOMAS DE HIPOGLUCEMIA

- La glucosa (azúcar) en sangre muy baja y en orina negativa.
- La acetona en orina, negativa.
- Hambre intensa.
- Sudores.
- Temblores.
- Debilidad generalizada.
- Confusión.
- Visión borrosa.
- Inquietud.
- Laxitud.
- Dolor de cabeza.
- Mucosas húmedas.

BOEHRINGER MANNHEIM España

SINTOMAS DE HIPERGLUCEMIA

- LA GLUCOSA (AZÚCAR) EN SANGRE Y EN ORINA SON POSITIVAS
- LA ACETONA EN ORINA ES POSITIVA
- MUCOSAS SECAS
- SED INTENSA
- MAYOR NECESIDAD DE ORINAR
- PICAZONE (INFECCIONES EN LA PIEL)
- NAUSEAS Y VOMITOS
- CANSANCIO, FATIGA

Diabetes Servicio

Boehringer Mannheim S.A.
Capitular 11-101 - 28002 Barcelona